

[illegible]

PARTOGRAMA

C.C. / H.CU.

[illegible]

DÍA		MES		AÑO			

POSICIÓN	VERT.	HORIZONTAL			
PARIDAD	TODAS	MÚLTIPARAS		NÚLIPARAS	
MEMBRANAS	ÍNT-GRAS	ÍNT-GRAS	ROTAS	ÍNT-GRAS	ROTAS

APELLIDO PATERNO	MATERN0	NOMBRES
------------------	---------	---------

VALORES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS CURVAS DE ALERTA

0:15	0:15	0:05	0:30	0:20
0:25	0:25	0:10	0:35	0:35
0:35	0:40	0:25	0:40	0:50
1:00	0:55	0:35	1:00	1:05
1:15	1:25	1:00	1:30	1:25
2:10	2:30	2:30	3:15	2:30

LÍNEA DE BASE DESDE LA QUE SE INICIA LA CURVA DE ALERTA

FRECUENCIA CARDÍACA FETAL	
PLANOS DE HODGE Y VARIEDAD DE POSICIÓN	
DILATACIÓN CERVICAL	●
RUPTURA ESPONTÁNEA MEMB.	(REM)
RUPTURA ARTIFICIAL MEMB.	(RAM)
INTENSIDAD	LOCALIZACIÓN
Fuerte +++	Suprapúbico SP
Moderada ++	Sacro S
Débil +	Contracciones
No lo percibe	Úterinas ▲

FRECUENCIA CARDÍACA FETAL	
Dips tipo I (Desaceleración precoz)	I
Dips tipo II (Desaceleración tardía)	II
Dips variables (Desaceleración variable)	V
Meconio	M
POSICIÓN MATERNA	
Lat. derecho	LD
Lat. izquierdo	LI
Dorsal	D
Semisentada	SS
Sentada	S
Parada o caminado	PC

*SCHWARCZ, R, DIAZ A,G.,
NIETO, F CLAP

REFERENCIAS

[illegible]

CRITERIOS CLÍNICOS/DISFUNCIÓN ÓRGANO-SISTEMA						VARIABLES IDENTIFICAR CASOS DE NEAR MISS no ☐ sí ☒						LABORATORIO						INTERVENCIONES					
Cardiovascular: si no Shock ☒ ☒ Paro cardíaco ☒ ☒ Hepático: Ictericia en predecompensa ☒ ☒ Respiratorio: Cianosis aguda ☒ ☒ Respiración jadeante (gaspig) ☒ ☒ Taquipnea severa FR > 40rpm ☒ ☒ Bradipnea severa FR < 6rpm ☒ ☒ Renal: si no Oliguria resistente a líquidos diuréticos ☒ ☒ Hematológicos/coagulación: Alteraciones de la coagulación ☒ ☒ Neurológico: Coma ☒ ☒ Inconsciencia prolongada >12 hs ☒ ☒ Accidente Cerebro Vascular ☒ ☒ Convulsiones incontrolables/ estado de mal epiléptico ☒ ☒ Parálisis generalizada ☒ ☒						Laboratorio: si no s/d Plaquetas < 50000por ml ☒ ☐ ☐ Creatinina > 300 micromoles/o >3,5mg/dl ☒ ☐ ☐ Bilirrubina > 100 moles/o > 6,0 mg/dl ☒ ☐ ☐ pH < 7.1 ☒ ☐ ☐ Po2 < 90% >1 hora ☒ ☐ ☐ PaO2/FiO2 < 200 mmHg ☒ ☐ ☐ Lactato > 5umol/L o 45mg/dl ☒ ☐ ☐						Administración continua de agentes vasoactivos ☒ ☐ ↓ Cuáles Intubación y ventilación no relacionada con la anestesia ☒ ☐ ↓ días Administración > 3 vol. de hemoderivados ☒ ☐ Ingreso de UCI >7 días ☒ ☐ días Histerectomía ☒ ☐ Dialisis en caso de IRA ☒ ☐ Reanimación cardio-pulmonar ☒ ☐											
RECIÉN NACIDO																							
SEXO H ☐ M ☐		PESO AL NACER g		P. CEFÁLICO cm 		EDAD GESTACIONAL sem. dias.		PESO E.G. adec. ☐ peq. ☒ gde. ☐		APGAR (min) 1er 5to n/a ☐		estimulac. aspiración máscara bolsa tubo endotraq. masaje c. medicación		FALLECE en LUGAR de PARTO no ☐ sí ☒		ATENDIÓ médico obst. enf. auxil. estud. empir. otro		Nombre					
no definido ☐		<2500 g ☐ >4000 g ☒		LONGITUD cm 		ESTIMADA ☐		ECO ☐		n/a ☐		REANIMACIÓN		TRASLADO aloj. neona conj. tolog.		PARTO ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐							
MÉTODO CANGURO Amerita Se aplica no ☐ sí ☒		NORMAL EXAMEN FÍSICO no ☐ sí ☒		DEFECTOS CONGÉNITOS CIE 10		ENFERMEDADES ninguna ☐ 1 ó más ☒		CIE 10		TAMIZAJE METABÓLICO Se realiza ☐ No se realiza ☒ n/a ☐		TAMIZAJE AUDITIVO Pasa OI OD No pasa OI OD No se hace		VACUNA Hepatitis B Dosis 0 Se puso No se puso		APEGO INMEDIATO sí no		Meconio 1er día sí no Lactancia Inmediata sí no					
EGRESO RN vivo ☐ fallece referencia ☒		hora min día mes año		Nombre establecimiento		Fallece durante la referencia no ☐ sí ☐		Fallece en el lugar de la referencia no ☐ sí ☐		ALIMENTO AL ALTA lact. excl. parcial artificial leche humana		DECÚBITO SUPINO no ☐ sí ☐		BCG no ☐ sí ☐		EGRESO MATERNO viva ☐ fallece referencia ☒		Fallece durante la referencia no ☐ sí ☐		Fallece en el lugar de la referencia no ☐ sí ☐			
Certificado Recién Nacido C.C./ H.CU.						EDAD días completos		<1 día ☐		PESO AL EGRESO g		Nombre del establecimiento		días completos desde el parto				ANTICONCEPCIÓN no ☐ sí ☐					
Nombre Recién Nacido						Responsable egreso RN / nombres completos / sello				Responsable egreso materno / nombres completos / sello								ASESORÍA MÉTODO pref. aced. DIU Barrera pref. aced. Hormonal pref. aced. Quirúrgico pref. aced. Natural Ninguno Otro					